

## **Abladiad microdon drwy'r croen ar gyfer hyperhidrosis ceseilaidd sylfaenol difrifol**

20 Rhagfyr 2017

Prin yw'r dystiolaeth gadarn sy'n dangos pa mor dda y mae'r driniaeth hon yn gweithio neu ba mor ddiogel ydyw ar gyfer hyperhidrosis ceseilaidd sylfaenol difrifol. Gellir defnyddio'r driniaeth hon, ond dim ond pan fydd cleifion yn cael archwiliadau rheolaidd i weld pa mor dda mae'n gweithio neu a yw wedi achosi problemau.

Hyperhidrosis ceseilaidd yw chwysu gormodol o dan y ceseiliau. Yn y driniaeth hon, mae dyfais a ddelir yn y llaw yn anfon microdonnau i'r chwarennau chwys yn y gesail i'w niweidio. Efallai y bydd angen ailadrodd y driniaeth hon tua 3 mis yn ddiweddarach. Y nod yw dinistrio'r chwarennau ac atal y chwysu.

Gall [NHS Choices](#) fod yn fan da i gael gwybod mwy. Mae gan [ganllawiau triniaethau ymyriadol](#) NICE fwy o wybodaeth am driniaethau a sut rydym yn eu hasesu.

### **A yw'r driniaeth hon yn addas i mi?**

Os cawsoch gynnig y driniaeth hon, dylai eich gweithwyr gofal iechyd proffesiynol drafod yr hyn y mae'n ei olygu, a dweud wrthyich am y risgiau a'r manteision. Dylent drafod eich opsiynau gyda chi, a gwranddo'n ofalus ar eich barn a'ch pryderon. Gall eich teulu fod yn rhan o'r broses hefyd, os ydych yn dymuno. Dylai hyn oll ddigwydd cyn y byddwch yn cytuno (rhoi cydsyniad) i gael y driniaeth. Dylech hefyd gael gwybod sut i gael rhagor o wybodaeth am y driniaeth. Darllenwch ragor am [wneud penderfyniadau am eich gofal](#).

### **Rhai cwestiynau i feddwl amdanynt**

- Beth yn union yw'r driniaeth hon?
- Beth yw'r manteision posibl? Pa mor debygol ydw i o'u cael?
- Beth yw'r risgiau neu'r sgil-ffeithiau? Pa mor debygol ydynt?
- Beth fydd yn digwydd os na fydd y driniaeth yn gweithio neu os aiff rhywbeth o'i le?
- Beth fydd yn digwydd os nad wyf eisiau'r driniaeth? A oes triniaethau eraill ar gael?

ISBN: 978-1-4731-2750-0