

Llid y bledren

Llid y bledren: oes angen gwrthfotigau arna i?

Mae llid y bledren yn cyfeirio at chwydd neu lid ar y bledren, a gall haint bacterol (haint y llwybr wrinol isaf, neu UTI isaf) ei achosi. Mae'r symptomau yn cynnwys yr angen i basio wrin yn fwy aml neu ar frys, poen neu losgi wrth basio wrin ac wrin cymylog neu sy'n arogl'i'n gryf. Mae'r symptomau eraill yn cynnwys teimlo'n flinedig neu'n wan a phoen yn yr abdomen isaf (ardal y bol). Gall llid y bledren wella ar ei ben ei hun ar ôl ychydig ddyddiau ond mae angen gwrthfotegau ar rai pobl.

Mae defnyddio gwrthfotigau pan nad oes eu hangen arnoch yn golygu efallai na fyddant yn gweithio cystal yn y dyfodol. Mae hon yn risg iechyd ddifrifol, felly mae NICE wedi ysgrifennu cyngor ar bryd i gynnig gwrthfotigau ar gyfer rhai cyflyrau cyffredin, gan gynnwys llid y bledren.

Dylai menywod beichiog, dynion, a phlant a phobl ifanc o dan 16 oed â llid y bledren gael cynnig gwrthfotegau ar unwaith.

Mae'n bosibl na fydd menywod nad ydynt yn feichiog yn cael cynnig gwrthfotegau ar unwaith. Yn hytrach na hyn, mae'n bosibl y byddwch yn cael cynnig prescripsiwn 'wrth gefn' ar gyfer gwrthfotigau. Gallwch ddefnyddio hyn i gael gwrthfotig os nad ydych yn dechrau teimlo'n well o fewn dau ddiwrnod, neu'n dechrau teimlo'n waeth.

Gallwch hefyd helpu eich symptomau mewn ffyrdd eraill, er enghraifft drwy gymryd cyffur lleddfu poen megis paracetamol, neu ibuprofen os bydd hyn yn addas i chi. Gallwch hefyd roi cynnig ar ddiodydd llugaeron neu gynnyrch sy'n lleihau asidrwydd eich wrin (sef cynnyrch alcalineiddio wrin), ond ni ddaeth NICE o hyd i unrhyw ymchwil i'w defnyddio i drin heintiau yn y llwybr wrinol.

Dechrau cymryd gwrthfotigau

Os cynigir gwrthfotigau i chi, dylai eich meddyg egluro y gallant achosi sgil-ffeithiau, fel dolur rhydd a chyfog (teimlo'n sâl).

Dylech weld eich meddyg os na fyddwch yn dechrau teimlo'n well ar ôl dau ddiwrnod i ddechrau cymryd eich gwrthfotigau, neu'n gynt os byddwch yn dechrau teimlo'n waeth. Mae'n bosibl y bydd eich meddyg yn eich atgyfeirio at yr ysbyty os bydd gennych arwyddion o salwch difrifol megis sepsis.

Ble y gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Caiff y penderfyniadau gorau ynglŷn â thriniaeth a gofal eu gwneud ar y cyd. Dylai eich gweithwyr iechyd proffesiynol roi gwybodaeth glir i chi, trafod eich opsiynau â chi a gwranddo'n ofalus ar eich barn a'ch pryderon. Mae NICE yn datblygu gwybodaeth i helpu menywod nad ydynt yn feichiog i wneud penderfyniadau am driniaethau ar gyfer llid y bledren.

Mae gwefan y GIG yn cynnwys mwy o wybodaeth am y canlynol:

- [llid y bledren](#)
- [gwrthfotigau](#).

Rydym hefyd wedi ysgrifennu gwybodaeth am [pam y dylid defnyddio gwrthfotigau yn gall](#).

Gwnaethom ysgrifennu'r canllawiau hyn gyda gweithwyr iechyd proffesiynol ac aelodau o'r cyhoedd. Mae'r holl argymhellion yn seiliedig ar yr ymchwil orau sydd ar gael.

ISBN: 978-1-4731-3121-7