

# Llawdriniaeth laparosgopig ar gyfer atgyweirio torgest yr arffed

**Deall arweiniad NICE –  
gwybodaeth i bobl ag ecsema atopig,  
eu teuluoedd a'u gofalwyr, a'r cyhoedd**

**Llawdriniaeth laparosgigig ar gyfer atgyweirio torgest yr arffed  
Deall arweiniad NICE – gwybodaeth i bobl ag ecsema atopig, eu  
teuluoedd a'u gofalwyr, a'r cyhoedd**

**Dyddiad cyhoeddi:** Medi 2004

**Dyddiad adolygiad:** Medi 2007

#### **I archebu copïau**

Gellir archebu copïau o'r llyfryn hwn o Linell Ymateb y GIG; ffoniwch 0870 1555 455 a dyfynnwch rif cyfeirnod N0611. Mae fersiwn Saesneg yn unig ar gael hefyd, rhif cyfeirnod N0610. Mae arfarniad technoleg NICE y seiliwyd y wybodaeth hon arno, sef 'Laparoscopic surgery for inguinal hernia repair', ar gael o wefan NICE ([www.nice.org.uk](http://www.nice.org.uk)). Mae fersiwn byr o'r arweiniad ('canllaw cyfeirio cyflym') ar gael o'r wefan ([www.nice.org.uk/TA083quickrefguide](http://www.nice.org.uk/TA083quickrefguide)), neu o Linell Ymateb y GIG, rhif cyfeirnod N0609.

---

## **Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol**

MidCity Place  
71 High Holborn  
London  
WC1V 6NA

Gwefan: [www.nice.org.uk](http://www.nice.org.uk)

ISBN: 1-84257-675-5

Cyhoeddwyd gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol  
Medi 2004

Cysodwyd gan Icon Design, Eton  
Argreffir yn ôl y galw

© Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol, Medi 2004. Cedwir pob hawl. Gellir atgynhyrchu'r deunydd hwn am ddim at ddibenion addysgol ac at ddibenion nad ydynt yn gysylltiedig ag elw o fewn y GIG. Ni chaniateir atgynhyrchu gan neu ar gyfer sefydliadau masnachol heb ganiatâd ysgrifenedig uniongyrchol y Sefydliad.

## Cynnwys

<b>Beth yw arweiniad NICE?</b>	<b>4</b>
<b>Beth yw torgest yr arffed?</b>	<b>5</b>
<b>Beth yw llawdriniaeth laparosgopig ar gyfer atgyweirio torgest yr arffed?</b>	<b>6</b>
<b>Beth mae NICE wedi ei argymell?</b>	<b>7</b>
<b>Beth ddylwn i ei wneud nesaf?</b>	<b>9</b>
<b>A fydd NICE yn adolygu ei arweiniad?</b>	<b>9</b>
<b>Gwybodaeth bellach</b>	<b>10</b>

## Beth yw arweiniad NICE?

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol (NICE) yn rhan o'r GIG. Mae'n cynhyrchu arweiniad (argymhellion) ar ddefnyddio meddyginiaethau, offer meddygol, profion diagnostig a gweithdrefnau clinigol a llawfeddygol o fewn y GIG yng Nghymru a Lloegr.

I gynhyrchu'r arweiniad hwn, mae NICE yn ystyried pa mor dda y mae'r feddyginiaeth, yr offer neu'r weithdrefn yn gweithio a hefyd pa mor dda y mae'n gweithio o'i gymharu â'r gost. Gelwir y broses hon yn arfarniad. Mae'r broses o arfarnu yn cynnwys gweithgynhyrchydd y feddyginiaeth neu'r offer y llunnir yr arweiniad ar ei gyfer, a'r sefydliadau sy'n cynrychioli'r gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, y cleifion a'r gofalwyr y bydd yr arweiniad yn effeithio arnynt.

Gofynnwyd i NICE edrych ar y dystiolaeth sydd ar gael am ddefnyddio llawdriniaeth laparosgopig ar gyfer atgyweirio torgest yr arffed. Gofynnwyd i NICE ddarparu arweiniad a fydd yn helpu'r GIG yng Nghymru a Lloegr i benderfynu pryd y dylid defnyddio llawdriniaeth laparosgopig.

## Beth yw torgest yr arffed?

Bydd torgest yn digwydd pan fydd rhan o organ yn symud o'i lleoliad arferol drwy wendid yn y mur amgylchynol o gyhyr neu feinwe. Pan fydd hyn yn digwydd yn y werddyr, fe'i gelwir yn dorgest yr arffed. Bydd leinin mewnlol yr abdomen (a elwir yn beritonewm) yn ymchwyddo drwy'r gwendid ym mur yr abdomen yn y werddyr. Yn aml, bydd y chwydd yn cynnwys rhannau o'r coluddyn (neu'r perfeddyn). O'r tu allan bydd yn ymddangos fel lwmp fel rheol, a gall achosi anesmwythyd. Mae'n bosibl y bydd torgest yr arffed yn cyfyngu ar weithgareddau o ddydd i ddydd a gallu'r person i weithio. Yn achlysurol, gall y torgesti hyn arwain at farwolaeth claf os ceir rhwystr i'r coluddyn o fewn y lwmp (a elwir yn dorgest dagedig).

Mae'r rhan fwyaf o dorgesti'r arffed yn digwydd ymysg dynion (dynion yw 98 o bob 100 o bobl sy'n datblygu torgest yn eu gwerddyr). Bydd cymaint â 3 o bob 10 o bobl sy'n cael torgest ar un ochr o'u gwerddyr yn mynd ymlaen i ddatblygu ail dorgest ar yr ochr arall.

Y ffordd fwyaf cyffredin o atgyweirio torgest yr arffed yw drwy lawdriniaeth 'agored', lle y gwneir toriad ym mur cyhyrol abdomen y claf. Atgyweirir y dorgest fel rheol gan ddefnyddio rhwyll arbennig i atgyfnerthu'r cyhyr sydd wedi gwanhau.

## Beth yw llawdriniaeth laparosgopig ar gyfer atgyweirio torgest yr arffed?

Yn aml, cyfeirir at lawdriniaeth laparosgopig fel llawdriniaeth 'twll clo'. Yn wahanol i lawdriniaeth 'agored', atgyweirir y dorgest drwy ychydig o fân doriadau bach yn hytrach na gwneud un toriad mawr ym mur cyhyrol yr abdomen.

Gwneir toriadau bach iawn yn abdomen y claf a rhoddir telesgop hyblyg main (laparosgop) ac offerynnau arbenigol eraill i mewn drwy'r toriadau hyn. Fel rheol, defnyddir darn o rwyll synthetig i gau'r dorgest ac i atal y coluddyn rhag gwthio drwy fur y cyhyr unwaith eto.

Gall y llawfeddyg gyrraedd y dorgest mewn dwy brif ffordd.

- Cynhelir y weithdrefn atgyweirio torgest rhagberitoneol trawsabdomenol (TAPP) drwy geudod yr abdomen. Rhoddir offerynnau i mewn drwy fur yr abdomen a thrwy'r bilen sy'n ei leinio (a elwir yn beritonewm) sy'n amgáu organau'r abdomen. Tynnir un o labedi'r peritonewm yn ôl dros y dorgest, a defnyddir rhwyll i orchuddio'r ardal sy'n achosi problem ym mur yr abdomen. Yna, ailosodir y llabed a thynnir yr offerynnau allan.

- Yr ymagwedd allberitoneol llwyr yw'r dechneg twll clo fwyaf newydd. Yn y dull hwn, atgyweirir y dorgest heb fynd i mewn i'r ceudod peritoneol. Mae'r weithdrefn hon yn anos i'w chynnal, ond mae'n bosibl bod y risg o niweidio organau yn yr abdomen yn llai.

## **Beth y mae NICE wedi ei argymhell ar lawdriniaeth laparosgopig ar gyfer atgyweirio torgest yr arffed?**

Yn ystod yr arfarniad, darllenodd a chlywodd Pwyllgor Arfarnu NICE dystiolaeth gan:

- astudiaethau o safon uchel o lawdriniaeth laparosgopig ar gyfer atgyweirio torgest yr arffed
- meddygon sy'n meddu ar wybodaeth arbenigol am dorgest yr arffed a sut i'w thrin
- unigolion sy'n meddu ar wybodaeth arbenigol am y materion sy'n effeithio ar bobl sy'n dioddef o dorgest yr arffed
- sefydliadau sy'n cynrychioli barn y bobl yr effeithir arnynt gan yr arweiniad (oherwydd eu bod yn dioddef o'r cyflwr, neu'n gofalu am rywun sy'n dioddef ohono neu oherwydd eu bod yn gweithio yn y GIG ac yn darparu gofal i bobl sy'n dioddef o'r cyflwr)

- gweithgynhyrchwyr rhwyllau prosthetig ac offer laparosgopig.

Crynohir y dystiolaeth yn yr arweiniad llawn (gweler y diwedd am fanylion). Ceir rhagor o fanylion am yr astudiaethau yn yr adroddiad asesu ar gyfer yr arfarniad hwn (gweler y diwedd am fanylion).

Mae NICE wedi gwneud yr argymhellion canlynol ynglŷn â defnyddio llawdriniaeth laparosgopig i drin torgest yr arffed o fewn y GIG yng Nghymru a Lloegr.

Gellir defnyddio llawdriniaeth laparosgopig fel opsiwn ar gyfer atgyweirio torgest yr arffed. Fel gyda phob llawdriniaeth, mae rhai risgiau ynghlwm, a allai gynnwys problemau difrifol yn syth ar ôl cael y llawdriniaeth, poen neu ddiffyg teimlad yn y man y cynhaliwyd y llawdriniaeth, a'r dorgest yn dychwelyd. Dylai eich meddyg esbonio risgiau a buddiannau pob math o lawdriniaeth (llawdriniaeth agored, neu llawdriniaeth laparosgopig gan ddefnyddio naill ai dulliau TAPP neu TEP) cyn i chi wneud penderfyniad ar ba ddull i'w gael. Wrth eich helpu i wneud y penderfyniad hwn, dylech chi a'ch meddyg yn arbennig ystyried:

- pa mor dda rydych yn debygol o ymdopi ag anesthetig cyffredinol



- p'un ai hon yw eich torgest gyntaf, neu p'un a yw wedi dychwelyd neu'n effeithio ar y ddwy ochr o'r werddyr
- p'un ai llawdriniaeth agored neu dwll clo fyddai'n gweithio orau ar gyfer eich torgest benodol
- faint o brofiad sydd gan y llawfeddyg o gynnal y tair techneg.

Dyweddodd NICE hefyd mai dim ond llawfeddygon sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig sy'n cynnal y weithdrefn yn rheolaidd, ddylai gynnal llawdriniaeth laparosgopig i atgyweirio torgest yr arffed drwy TAPP neu TEP.

## **Beth ddylwn i ei wneud nesaf?**

Os ydych chi neu rywun rydych yn gofalu amdano yn dioddef o dorgest yr arffed, dylech drafod yr arweiniad hwn gyda'ch arbenigwr.

## **A fydd NICE yn adolygu ei arweiniad?**

Bydd. Caiff yr arweiniad ei adolygu ym mis Medi 2007.

## Gwybodaeth bellach

Mae gwybodaeth bellach am NICE a'r arweiniad llawn ar lawdriniaeth laparosgopig ar gyfer atgyweirio torgest yr arffed a roddwyd i'r GIG ar gael ar wefan NICE ([www.nice.org.uk](http://www.nice.org.uk)). Mae'r adroddiad asesu, sy'n cynnwys manylion yr astudiaethau yr edrychwyd arnynt, hefyd ar gael ar wefan NICE. Mae fersiwn byr o'r arweiniad ('canllaw cyfeirio cyflym') ar gael ar y wefan ac o Linell Ymateb y GIG (rhif cyfeirnod N0609).

Os oes gennych fynediad i'r Rhynggrwyd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am dorgest yr arffed ar wefan Galw Iechyd Cymru ([www.nhsdirect.wales.nhs.uk](http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk)). Gallwch ffonio Galw Iechyd Cymru hefyd ar 0845 4647.